

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER SIVI DENİZ YOSUNU Pacific

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 5
Alginik Asit	: % 1
Giberallik Asit	: 1 ppm
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 2
Maksimum EC	: 4.9 dS/m
pH Aralığı	: 9.2-11.2



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir hafta ara ile uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Tüm Açık Alan Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Tüm Yaprığı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvrırcık, Aysberg v.s)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Kavun, Karpuz, Kabak v.s	Ekim dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Tüm Yumru Bitkilerde (Soğan, Sarımsak, Patates Havuç, Turp, Şeker Pancarı)	Çiçeklenme başlangıcında ve yumru bağlama ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ v.s)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000 – 1500 cc / da veya 80-100 cc / ağaç 30 cc / omca
Muz ve Narenciye, İncir Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 200-250 cc	1000 – 1500 cc / da veya 80-100 cc / ağaç
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Nohut, Fasulye Mercimek Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Çay)	5-6 yapraklı dönemden hasat öncesine kadar 20-30 gün aralıklar ile 2-3 tekerrürde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	1000 – 1500 cc / da
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	İlkbahardan yabancı ot ilacı ile birlikte ve kardeşlenme döneminde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	-----
Tüm Yem Bitkilerinde (Yonca Korunga Fig)	Her biçimden on gün sonra yapraktan uygulanır	100 litre suya 150-200 cc	-----

Faruk Çelikkaya
Şirket Vekili

AGRIEGE TARIM
GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kamışlıyaka Mah. 7087 Sok. No:10/A Bornova - İZMİR
Hasan Tahsin VO. 483 045 4800 Sipri No: Merkez 199418
Muzn: No: 042304548000001