



SHERPA PLUS

Fosfor ve çinko genlerin ve kromozomların yapı taşıdır. Kök gelişimine destekler. Bitkinin toprakta bulunan besin maddelerinden daha fazla faydalanmasını sağlar.

Fosfor ve çinko elementlerinin çiçeklenme ve meyve oluşumu için birlikte verildiği özel bir üründür.

Bitki tarafından kısa sürede doğal şelatlar sayesinde alımı kolaylaştırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% W/W
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5

KULLANIM ALANI,ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek)	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır.	100 litre suya 250-300 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek)	Fidelerin şaşırtılmasından sonra 15 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır.	100 litre suya 300-350 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Kışlık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Prasa, Ispanak, Aysberg, Lahana)	Fide döneminden itibaren 15 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır.	100 litre suya 300-350 cc	1-2,5 litre/da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır.	100 litre suya 250-300 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Vişne, Kiraz, Kayısı, Ayva)	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi dönemde uygulanır.	100 litre suya 350-450 cc	1-2,5 litre/da
Muz ve Narenciye, İncir, Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi dönemde uygulanır.	100 litre suya 350-450 cc	1-2,5 litre/da
Bağcılık	Çiçekten sonra, koruk dönemi, meyve büyütme ve hasat öncesi dönemde uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1-2,5 litre/da
Kavun, Karpuz, Kabak	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Yumruklu Bitkiler (Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Ş. Pancarı, Sarımsak)	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya Fasulye, Yer Fıstığı)	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Tütün)	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	1-2,5 litre/da
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	Yabancı ot ilacı ile ve kardeşlenme dönemi uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	----
Yeşil Alan ve Yem Bitkilerinde (Yonca, Korunga Fiğ)	Her biçimden 10 gün sonra uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	----

AGRIEGE TARIM GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ 5476 SOKAK NO:1

BUHARA İŞ MERKEZİ KAT:2 DAİRE:21 BORNova / İZMİR

TEL: 0232 483 61 22 • GSM: 0535 506 33 23

www.agriegie.com.tr • info@agriegie.com.tr

 www.linkedin.com/company/agriegie-tarim

 www.instagram.com/agriegieofficial

 www.facebook.com/agriegieofficial

 www.twitter.com/agriegieofficial